N XVII Vols. 1-2

B. 1. 3



9

Flora Danica

FLORÆ DANICÆ

ICONUM

FASCICULUS QUARTUS.

MDCCLXV.

NOMENCLATURA
ET
LOCI NATALES PLANTARUM,
quas quartus hic Faſciculus exhibet.

Tab. CLXXXI.

Iconographis antiquis. *Orobanche.* Geſn. Op. T. I. Tab. XIV. f. CXVII. T. 12. f. 104. *Satyrium nonum.* Trag. 785. *Neottia.* Dod. Pemt. 553. *Pſeudoleimodoron.* Cluſ. Hiſt. 271. Lob. Ic. 195. *Nidus avis.* Lugd. 1073. Hort. Aichſt. Aeſt. ord. IV. t. 4. f. 3.
Orchis abortiva fuſca. C. B. P. 24. Kyll. Vir.
Ophris aphylla. Hall. Helv. 278.
Ophrys, nidus avis, *bulbis fibroſo faſciculatis, caule vaginato, nectarii labio bifido.* Linn. Sp. pl. 1339.
Locus. In ſylva Promontorii Inſulæ *Monæ* circa *Sommerſpiir.* Circa *Sandholm* prope Hirſchholm, ad radices arborum paraſitica, rarior.

Tab. CLXXXII.

Sonchus lævior cœruleo flore. Cluſ. Hiſt. CXLVII. Pann. 651.
Intybus platyphyllus. Thal. herc. 62.
Sonchus lævis laciniatus cœruleus ſ. Sonchus alpinus cœruleus. C. B. P. 124.
Sonchus, alpinus, *pedunculis ſquamoſis, floribus racemoſis, foliis runcinatis.* Linn. Sp. pl. 1117. Hort. Cliff. 385. Hall. Helv. 754. Ström. Sundm. 126.
Norvegis *Tort. Biörnstort.* Sundmörenſibus *Tröſt.* Ström.
Locus. In ſylvis ſubalpinis Norvegiæ.

Tab. CLXXXIII.

Rhodia radix. Cluſ. Hiſt. LXV. Pann. 484. Dod. Pemt. 347. S. Paulli 335. C. B. P. 286.
Sedum foliis ſerratis, tetrapetalum, ſexu diſtinctum. Hall. Helv. 394.
Rhodiola, roſea. Linn. Sp. pl. 1465. fl. ſv. II. 912. Ström Sundm. I. 119.
Norvegis Aggershuſenſibus *Smörbug*, Sundmörenſibus *Söſtergræs*, *Haarvoxter.* Ström. Germanis *Roſenwurz.*
Locus. Vulgaris in alpibus Norvegiæ.

Tab. CLXXXIV.

Naſturtium anguſtifolium. Fuchſ. Hiſt. 307.
Iberis. Matthiol. 293.
Naſturtium ſylveſtre oſyridis folio. C. B. P. 105. Kyll. Vir.
Lepidium, ruderale, *floribus diandris apetalis, foliis radicalibus dentato pinnatis; ramiferis linearibus integerrimis.* Linn. Sp. pl. 900. fl. ſv. 572. Hall. Helv. 543. 1. Gœtt. 245.
Germanis *Beſenkraut.*
Locus. Vulgaris in ruderatis, & glareoſis, in plateis Hafniæ. Chriſtianiæ in aggere verſus Obſlo.

Tab. CLXXXV.

Conſolida media Genevenſis. J. B. III. 432.
Bugula foliis anguloſe dentatis caule ſimplici. Hall. Helv. 635.
Ajuga, pyramidalis, *tetragonopyramidalis.* Linn. Sp. pl. 785. fl. ſv. 512. Ström Sundm. I. 70.
Sundmörenſibus *Jonſok Koll.* Ström.
Locus. In Norvegiæ pratis & paſcuis ſylvaticis ſiccis.

Tab. CLXXXVI.

Potamogeton puſillum fluitans. Bocc. rar. 42. t. 20. f. 5.
Potamogeton maritimum ramoſiſſimum, grandiuſculis capitulis, capillaceo folio. Plukn. t. 216. f. 5. Raj. Syn. III. 150.
Potamogeton, marinum, *foliis linearibus alternis diſtinctis inferne vaginantibus.* Linn. Sp. pl. 184. It. Gotl. 221.
Locus. Copioſe in ſinu Neſtvedenſi prope *Gavnöe*, alibique ad Siællandiæ littora, in aqua marina pacata.

Tab. CLXXXVII.

Kali parvum hirſutum. J. B. III. 702. C. B. P. 289.
Salſola, hirſuta, *diffuſa herbacea, foliis teretibus obtuſis tomentoſis.* Linn. Sp. pl. 323. Gouan. Monſp. 125. 13.
Locus. Paſſim in littoribus Inſularum Danicarum, mixta Chenopodio maritimo.

Tab. CLXXXVIII.

Auricula urſi IV. Cluſ. pann. 349. Hiſt. 303. Geſn. Op. ed. Schmied. T. I. t. 8. f. 68?
Primula foliis carnoſis glabris integerrimis. Hall. Helv. 485.
Primula, integrifolia, *foliis integerrimis glabris oblongis, calycibus tubuloſis obtuſis.* Linn. Sp. pl. 205. Jacquin. Vindob. 209. Obſ. Bot. I. 26. t. 15.
Locus. In Finmarkia, circa *Haſvig*, unde attulit ſumme reverendus Dn. Gunnerus, Epiſcopus Nidroſienſis, Hiſtoriæ naturalis fautor & cultor eximius.

Tab. CLXXXIX.

Campanula alpina linifolia cœrulea. C. B. Prodr. 34.
Campanulæ, rotundifoliæ, varietas. Linn. Sp. pl. 232.
Locus. Bis vidi in Norvegia parciſſima copia, in pratis ſubalpinis circa *Slidre* & *Stangvigen.*

Tab. CXC.

Ruta muraria. Trag. Hiſt. 530. Dod. pemt. 470. C. B. P. 356. Kyll. Vir. Blakwell. 219. Plum. Fil. præf. XXIX. t. A. f. 3. *Herba flatulenta.* Pontopp. H. N. N. I. 210. t. 9.
Aſplenium, ruta muraria, *frondibus alternatim decompoſitis: foliolis cuneiformibus crenulatis.* Linn. Sp. pl. 1541. Ström Sundm. I. 74.
Norvegis Voſſenſibus *Torbol*, Sundmœrenſibus *Smaablom*, Ström. *Muurrude, Steenrude.* Kyll. Germanice *Mauerraute.*
Locus. Vulgaris in Norvegia, in rupibus, paſſimque in alpinis copioſiſſima, rarior in Dania, *Bornholm Almingen.*

Tab. CXCI.

Calamaria folio longiore & graciliore. Dill. Muſc. 541. t. 80. f. 2.
Iſoetes, lacuſtris. Linn. Sp. pl. 1563. it. Scan. 419.
Locus. In Norvegia, prope Templum in *Norderhough*, in fundo lacus arenoſo, copioſe.

Tab. CXCII.

Muſcus aureus capillaris minor, capitulis geminatis. Morſ. III. 629. ſ. 15. t. 6. f. 10. Vaill. Pariſ. 130. t. 26. f. 4.
Bryum ampullaceum, foliis thymi pellucidis, collo ſtrictiore. Dill. Muſc. 343. t. 44. f. 3.
Splachnum, ampullaceum, *umbraculo ampullaceo obconico.* Linn. Sp. pl. 1572. Amœn. II. 280.
Locus. Semel tantum vidi in Norvegia in tecto tugurii alpini (Sætter) compoſito ceſpite paludoſo putrido ſtercorato. Pictor collum capituli juſto paullo brevius pinxit.

Tab. CXCIII.

Picea Matthioli. 97. *latinorum.* J. B. I. p. II. 238. *Major ſ. Abies rubra.* C. B. P. 493. Aichſt. vern. frut. t. 4. f. 1.
Abies tenuiore folio, fructu deorſum inflexo. Tournef. Inſt. t. 353. 354. Du Hamel Arb. I.
Pinus, abies, *foliis ſolitariis ſubulatis mucronatis lævibus bifariam verſis.* Linn. Sp. pl. 1421. Ström Sundm. I. 144.
Norvegis & Danis *Gran.* Germanis *Rothe Tanne.*
Locus. Norvegiæ ſylvæ pleræque ex hac arbore conſtant. In Dania non eſt indigena.

Tab. CXCIV.

Arthritica hiberna. Geſn. Op. I. t. 8. f. 65.
Primula veris pallido flore humilis. Cluſ. Hiſt. 302.
Verbaſculum ſylveſtre majus ſingulari flore. C. B. P. 241. Kyll. Vir.
Primula, veris, acaulis, *foliis dentatis rugoſis.* Linn. Sp. pl. 205.
Norvegis Liſterenſibus *Cuſmusblom.*
Locus. Vulgaris in Norvegiæ Provincia Chriſtianſandenſi, in Dania rarior.

Tab. CXCV.

Fontinalis lucens major. J. B. III. 769.
Potamogeton foliis anguſtis ſplendentibus. C. B. P. 193. Kyll. Vir.
Potamogeton, lucens, *foliis lanceolatis planis in petiolos deſinentibus.* Linn. Sp. pl. 183. Ström Sundm. I. 116.
Locus. In lacubus & fluviis Daniæ non rara.

Tab. CXCVI.

Potamogeton altera Dodonæi. J. B. III. 770. *perfoliatum.* Raj. Hiſt. 188.
Potamogeton foliis latis ſplendentibus. C. B. P. 195. Kyll. Vir.
Potamogeton, perfoliatum, *foliis cordatis amplexicaulibus.* Linn. Sp. pl. 182.
Locus. Vulgaris in lacubus & fluviis Daniæ.

Tab. CXCVII.

Salix pumila foliis utrimque candicantibus & lanuginoſis. C. B. P. 474. Raj. Syn. III. 447. t. 19. f. 3.
Salix foliis integris utrimque hirſutis lanceolatis. Hall. Helv. 155. t. 5. Gmel. Lib. I. 164. t. 36. f. 1.
Salix, arenaria, *foliis integris ovatis acutis: ſupra ſubvilloſis, ſubtus tomentoſis.* Linn. Sp. pl. 1447.
Locus. In Norvegiæ alpinis & ſylvis ſubalpinis.

Tab. CXCVIII.

Samolus Valerandi. J. B. III. 780. cf. Walth. Hort. 162. t. 23.
Anagallis aquatica, rotundo folio non crenato. C. B. P. 252. Kyll. Vir. Moriſ. III. 323. f. 3. t. 24. f. 26. 28.
Samolus Valerandi. Linn. Sp. pl. 243. Ström Sundm. I. 122.
Locus. Paſſim in Daniæ paſcuis maritimis irriguis, omnium copioſiſſime in Inſula *Maſnöe,* prope Wordingborg.

Tab. CXCIX.

Caſſuta ſ. Cuſcuta. Fuchſ. Hiſt. 348. Matthiol. 1279. Dod. pemt. 554. S. Paul. Fl. D. 217. 67. C. B. P. 219. Kyll. Vir.
Cuſcuta, europæa, *floribus ſeſſilibus.* Linn. Sp. pl. 180. Ström Sundm. I. 84.
Danis *Hörſilke.* Germanis *Flachsſeide, Frauenhaar.*
Locus. Paſſim in Dania & Norvegia, paraſitica aliis plantis inhæret volubilis, iisque nutritur.

Tab. CC.

Hirculus qui Chamaeciſti genus. Dortm. ap. Cluſ. Cur. poſt. 5. 6.
Sedum paluſtre nardi celticæ foliis, flore luteo. Moriſ. III. 477. f. 12. t. 8. f. 5.
Helianthemum paluſtre aureum linophyllum, flore aureo punctato. Sperling ap. Barthol. ciſta med. 466.
Saxifraga anguſtifolia autumnalis, flore luteo guttato foliolis florum magis acuminatis. Breyn. Cent. p. 106. & t. 48. Certo huc pertinere demonſtrant callus in ungue petali & ramenta ferruginea ſummi caulis.
Saxifraga petalis latiſſimis luteis lineatis. Hall. Helv. 399. t. 8.
Saxifraga, hirculus, *foliis caulinis lanceolatis alternis nudis inermibus, caule erecto.* Linn. Sp. pl. 576.
Locus. In Siælandia, rarius, circa *Ortrup,* in *Jonſtrups Vænge,* in *Sandholm,* in pratis uliginoſis muſcoſis, cum Hypno cuſpidato & Droſera.

Tab. CCI.

Hieracium minimum. Cluſ. Hiſt. CXLII.
Hieracium minus folio ſubrotundo. C. B. P. 127. Kyll. Vir.
Hyoſeris, minima, *caule diviſo nudo, pedunculis incraſſatis.* Linn. Sp. pl. 1138.
Locus. In arvis apricis, circa *Peerskirke* in Bornholm.

Tab. CCII.

Coronopus. Ruell. 493. 494. Hall. Helv. 542. *Cornu cervi repens.* Dod. pemt. 110.
Ambroſia campeſtris repens. C. B. P. 138. *Naſturtium verrucoſum.* J. B. II. 919. Kyll. Vir.
Cochlearia, coronopus, *foliis pinnatifidis.* Linn. Sp. pl. 904.
Locus. Paſſim in campis apricis nudis, areis, viis, copioſiſſime in Bornholmia.

Tab. CCIII.

Alga lacuſtris. Geſn. op. T. I. t. 17. f. 51.
Potamogeton caule compreſſo, folio graminis canini. Raj. Hiſt. 189. Kyll. Vir.
Potamogeton, compreſſum, *foliis linearibus obtuſis, caule compreſſo.* Linn. Sp. pl. 183. Hall. Helv. 201.
Locus. Copioſe in amne Neſtvedenſi, potiſſimum prope *Gavnöe.*

Tab. CCIV.

Myagro ſimilis ſiliqua rotunda. C. B. Prodr. 52. Kyll. Vir. 107. Myagr. Monoſp.
Myagrum, paniculatum, *ſiliculis lentiformibus orbiculatis, punctato rugoſis.* Linn. Sp. pl. 894. Hall. Helv. 536.
Locus. Paſſim inter ſegetes, copioſiſſima in Inſula *Bogöe.*

Tab. CCV.

Pſeudoliguſtrum. Dod. pemt. 777.
Cerafus racemoſa ſylveſtris fructu non eduli. C. B. P. 451. Kyll. Vir.
Prunus, Padus, *floribus racemoſis, foliis deciduis, baſi ſubtus biglandulofis.* Linn. Sp. pl. 677. Hall. Helv. 357. Ström Sundm. I. 117.
Norvegis & Danis *Heg, Heggebær.* Germanis *Tölpelgensbaum, Taubenkirſchen.* Bœhm. Lipſ.
Locus. In Norvegia meridionali vulgaris. In Dania Kylling, ipſe tamen non obſervavi niſi in Bornholmia.

Tab. CCVI.

Archangelica. Cluſ. Hiſt. CXCV. & *Angelica major.* Dod. pemt. 318. S. Paul. Fl. D. 164. 14.
Angelica ſativa. C. B. P. 155. Kyll. Vir. *Angelica.* Riv. Irr. pentap. t. 15.
Angelica, archangelica, *foliorum impari lobato.* Linn. Sp. pl. 361. Ström Sundm. I. 71. Pontopp. H. N. N. I. 185.
Norvagis *Quanne, Quanrod.* Danis *Angelica, Engelſkiær.* Germanis *Angelica, Bruſtwurz.* Rupp.
Locus. In Norvegiæ alpibus, & littoribus maritimis, copioſe.

Tab. CCVII.

Imperatoriæ adfinis umbellifera ſcotica. Sibb. Scot. 32. t. 12. f. 3.
Liguſticum humilius ſcoticum. Plukn. t. 96. f. 2.
Seſeli maritimum ſcoticum. Herm. Parad. 227. t. 227. Riv. Pentap. irr. t. 59.
Liguſticum, ſcoticum, *foliis biternatis.* Linn. Sp. pl. 359. Ström Sundm. I. 103.
Norvegis Sundmörenſibus *Vildlöbſtilk.* Ström.
Locus. Frequens in Norvegiæ littoribus maritimis; in Dania prope *Rödby* Laalandiæ.

Tab. CCVIII.

Sium Erucæ folio. C. B. P. 154. Kyll. Vir.
Cicuta Wepferi proprio libro. t. 1–4.
Cicutaria. Riv. Pentap. irr. t. 77.
Cicuta, viroſa, *umbellis oppoſitifoliis, petiolis marginatis obtuſis.* Linn. Sp. pl. 366. Hall. Helv. 436. n. 5.
Norvegorum *Selsnæpe.* Pontopp. H. N. N. I. 201. ſq. *Sylenæbber.* S. Paul. Quadrup. 531.
Locus. In Norvegia prope *Sels* Guldbrandsdaliæ, & *Reendalen* vicinæ Oeſterdaliæ. In Dania & Holſatia vulgaris, in lacubus.

Tab. CCIX.

Graticla minima. Geſn. op. T. I. t. 10. f. 87.
Anagallis aquatica anguſtifolia. J. B. III. 780. *Scutellata.* C. B. Prodr. 119. Kyll. Vir. Riv. monop. irr. t. 96.
Veronica, ſcutellata, *racemis lateralibus pedicellis pendulis, foliis linearibus integerrimis.* Linn. Sp. pl. 16.
Locus. Vulgaris in utriusque regni pratis inundatis.

Tab. CCX.

Solanifolia circæa dicta major. C. B. P. 168. Kyll. Vir. p. 28. Aichſt. Aeſt. ord. 3. t. 7.
Circæa, lutetiana, *caule erecto, racemis pluribus.* Linn. Sp. pl. 12. It. Weſtg. 213.
Germanis *St. Stephanskraut*, Tabern. *Hexenkraut.* Bœhm. Lipſ.
Locus. Non rara in Daniæ nemoribus umbroſis, humidis.

Tab.

Tab. CCXI.

Medica echinata minima. J. B. II. 386.
Medicago leguminibus cochleatis, aculeis uncinatis alternis externe donatis, ſtipulis integris. Guett. Stamp. I. 249.
Medicago polymorpha minima. Linn. Sp. pl. 1099. Leyſer. Hall. 699.
Locus. in Bornholm, in præcipiti islittoris circa *Arnage*, item circa *Hammershuus.*

Tab. CCXII.

Salix pumila folio rotundo. J. B. I. p. II. 217. Scheuchz. It. T. II. 340.
Salix pumila folio rotundo integro, julo gracili. Hall. Helv. 154.
Salix, reticulata, *foliis integerrimis glabris ovatis obtuſis.* Linn. Sp. pl. 1446. fl. ſv. II. 888. fl. lapp. t. 7. f. 1. 2. t. 8. f. L. Jacq. Vindob. 296.
Locus. Paſſim in alpibus Norvegiæ.

Tab. CCXIII.

Gramen typhoides alpinum, ſpica brevi denſa & velut villoſa. Scheuchz. Agr. 64. t. 3.
Phleum, alpinum, *ſpica ovato cylindracea.* Linn. Sp. pl. 88. Ström Sundm. I. 111.
Locus. In Norvegiæ pratis alpinis.

Tab. CCXIV.

Fucus palmaris anguſtifolius ad extrema veſiculis rugoſis bifurcatus. Moriſ. III. 647. ſ. 15. t. 8. f. 12.
Fucus pumilus dichotomus, ſegmentis ex una parte gibboſis, ex altera excavatis. Doody apud Raj. Syn. III. 43. 12.
An *Fucus* exciſus. Linn. Sp. pl. 1627. & Hudſ. fl. angl. 468?
Locus. in Norvegia ad littora oceani, e. g. *Evindvig*, Provinciæ Bergenſis.

Tab. CCXV.

Muſcum hunc, novum ni fallor, ad Lycopodia aut Fontinales amandandum, inveni compluribus in Norvegia locis ſatis copioſum, e. g. circa *Næſs* in Hallingdalen, *Gorter* in Elverum Oeſterdaliæ, locis arenoſis inundatis, cæſpitoſum, non difficulter agnoſcendum tenello habitu ſtrictorum cauliculorum & flaveſcente colore. Sæpe data opera & repetito ſtudio a me & pictore examinatum hic pinxit qualem conſtanter vidimus. Cf. Dill. Muſc. 259. t. 33. f. 4. & p. 453. var. erecta.

Tab. CCXVI.

Clathroidaſtrum. Mich. Gen. 214. t. 94. f. 1. 2. Hall. Helv. 8.
Stemonitis. Gleditſch. fung. 141.
Clathrus, nudus, *ſtipitatus, capitulo oblongo axi longitudinali adnato.* Linn. Sp. pl. 1649.
Locus. Paraſitica, plantis vivis lignisque putreſcentibus innaſcens.

Tab. CCXVII.

Filix paluſtris. Dod. pemt. 463.
Filix ramoſa non dentata florida. C. B. P. 357. Kyll. Vir. *floribus inſignis.* J. B. III. 728.
Oſmunda regalis ſ. Filix florida. Plum. Fil. præf. 35. t. B. f. 4.
Oſmunda, regalis, *frondibus bipinnatis apice racemiferis.* Linn. Sp. pl. 1521.
Bornholmenſibus *Engelbregne.*
Locus. Paſſim in Dania, copioſe in Bornholmia ad *Borreſöe*, in Fionia prope Nyborg in ſylva ad *Holkenhaven* pertinente.

Tab. CCXVIII.

Geranium ſaxatile. Thal. Herc. 44. f. 5.
Geranium rotundifolium ſaxatile montanum. Col. Ecphr. 137. 138.
Geranium lucidum ſaxatile. C. B. P. 318.
Geranium, lucidum, *pedunculis bifloris, calycibus pyramidatis angulatis elevato rugoſis, foliis quinquelobis rotundatis.* Linn. Sp. pl. 955. It. Gotl. 228.
Locus. In *Almingen* Bornholmiæ circa *Borreſöe*, in rupe umbroſa.

Tab. CCXIX.

Ranunculus ſylveſtris tertius. Dod. Pemt. 427.
Ranunculus arvenſis echinatus. C. B. P. 179. Kyll. Vir.
Ranunculus, arvenſis, *ſeminibus aculeatis, foliis ſuperioribus decompoſitis linearibus.* Linn. Sp. pl. 780. It. Oel. 104.
Locus. Copioſiſſime inter ſegetes Bornholmiæ.

Tab. CCXX.

Bolbocaſtanon. Dod. pemt. 334. Lob. Hiſt. 429.
Bulbocaſtanum majus folii apii. C. B. P. 162.
Bunium, bulbocaſtanum. Linn. Sp. pl. 349.
Locus. Circa *Stavanger* & *Bergen*, in pratis & paſcuis ſiccioribus.

Tab. CCXXI.

Armeria prolifera. Lob. Ic. 449.
Caryophyllus ſylveſtris prolifer. C. B. P. 209. Segu. Ver. I. 433. t. 7. f. 1.
Dianthus, prolifer, *floribus aggregatis capitatis; ſquamis calycinis ovatis obtuſis muticis tubum ſuperantibus.* Linn. Sp. pl. 587.
Locus. In præcipitiis littoris circa *Arnage* Bornholmiæ.

Tab. CCXXII.

Potamogeton gramineum latiuſculum, foliis & ramificationibus denſe ſtipatis. Raj. Syn. III. 149. t. 4. f. 3.
Potamogeton, gramineum, *foliis lineari lanceolatis alternis ſeſſilibus ſtipula latioribus.* Linn. Sp. pl. 184.
Locus. In Lacu *Oelene* Bornholmiæ.

Tab. CCXXIII.

Muſcus aureus capillaris paluſtris, inter folia folliculis rotundis quadripartitis. Plukn. t. 48. f. 1.
Graminifolia paluſtris repens, vaſculis granorum piperis æmulis. Raj. Syn. III. 136. Moriſ. III. 608. f. 15. t. 7. f. 49.
Pilularia paluſtris juncifolia. Vaill. Pariſ. 159. t. 15. f. 6. Juſſieu Act. Par. 1739. p. 240. t. 11. Dill. Muſc. 538. t. 79. f. 1.
Pilularia, globulifera. Linn. Sp. pl. 1563.
Locus. Copioſe in Bornholmiæ lacu *Oelene*, & in *Hammershuusſöe*, & in lacus inter *Lyngby* & *Fridrichsdal*, ripa ſeptentrionali, fundo ſubgraminoſo pratenſi.

Tab. CCXXIV.

Satyrium baſilicum mas. Fuchſ. Hiſt. 712.
Orchis palmata minor calcaribus oblongis. C. B. P. 85. Kyll. Vir. Vaill. Par. t. 30. f. 8.
Orchis radicibus palmatis, calcare ovario longiore, labello aequaliter trifido unicolore. Hall. Helv. 271.
Orchis, conopſea, *bulbis palmatis, nectarii cornu ſetaceo germinibus longiore: labio trifido; petalis duobus patentiſſimis.* Linn. Sp. pl. 1335. It. Oel. 46.
Voſſenſibus *Ormegræſs.*
Locus. Paſſim in utriusque regni pratis & paſcuis editis.

Tab. CCXXV.

Fiſtularia. Dod. pemt. 556. Cluſ. pann. 709.
Pedicularis pratenſis purpurea. C. B. P. 163. Kyll. Vir.
Pedicularis minor. Riv. Monop. irr. t. 92.
Pedicularis, ſylvatica, *caule ramoſo, calycibus oblongis angulatis lævibus corollis labio cordato.* Linn. Sp. pl. 845. Hall. Helv. 622. Ström Sundm. I. 111.
Locus. In utriusque regni paſcuis ſubhumidis non rara.

Tab. CCXXVI.

Uſnea capillacea citrina, fruticuli ſpecie. Dill. Muſc. 73. t. 13. f. 16.
Lichen, vulpinus, *filamentoſus ramoſiſſimus erectus faſtigiatus inæquali anguloſus.* Linn. Sp. pl. 1623. Ström. Sundm. I. 103.
Norvegis *Ulvemoſſe.*
Locus. In Norvegia, ſpeciatim dynaſtia *Romsdalen* & Paroecia *Leſſöe.*

TAB.

Tab. CCXXVII.

Lichenoides lacunoſum candidum glabrum, endiviæ criſpæ folio. Dill. Muſc. 162. t. 21. f. 56.
Lichen, nivalis, *foliaceus adſcendens laciniatus, criſpus glaber lacunoſus albus margine elevato.* Linn. Sp. pl. 1612.
Locus. Vulgaris in alpibus Norvegiæ, locis ſiccis, apricis.

Tab. CCXXVIII.

Gramen avenaceum, paniculatum, alpinum humile, locuſtis in ſpicam collectis, varicoloribus, ariſtatis. Scheuchz. Agr. 221. t. 6.
Aira, ſpicata, *foliis planis, panicula ſpicata, floſculis medio ariſtatis: ariſta reflexa laxiore.* Linn. Sp. pl. 95. fl. ſv. II. 69.
Locus. Rarius in alpibus Norvegiæ.

Tab. CCXXIX.

Leucojum luteum ſylveſtre hieracifolium. C. B. Prodr. 102.
Leucojum luteum ſylveſtre pannonicum ſerrato folio. J. B. II. 873. Icon. dextra. Aichſt. Aeſt. ord. 2. t. 15.
Keiri ſylveſtre foliis hieracii. Rupp. Hall. 77. Gœtt. 257. Helv. 564. Heſperis 2 b.
Leucojum anguſtifolium alpinum flore ſulphureo. Allioni Ped. 44. t. 9. f. 3.
Eryſimum, hieracifolium, *foliis ſerratis lanceolatis.* Linn. Sp. pl. 923. Sp. pl. 602. uti quidem mihi videtur.
Locus. Rarius in Norvegia, in arce *Aggershuſenſi*, in Inſulis prope *Neblungen*, circa *Selsfors* in Nord-Ranen, locis rupeſtribus apricis.

Tab. CCXXX.

Armeria ſylveſtris altera. Lob. Ic. 448.
Caryophyllus barbatus ſylveſtris. C. B. P. 208. Kyll. Vir.
Dianthus, armeria, *floribus aggregatis faſciculatis: ſquamis calycinis lanceolatis villoſis tubum æquantibus.* Linn. Sp. pl. 586.
Locus. Paſſim locis ſiccis in arvis & campis, rarius in Siællandia, copioſius in Bornholmia.

Tab. CCXXXI.

Vitis idæa II. Cluſ. Hiſt. 61. 62.
Vitis idæa foliis ſubrotundis exalbidis. C. B. P. 470. Kyll. Vir.
Vaccinium, uliginoſum, *pedunculis unifloris, foliis integerrimis ovalibus baſi ciliatis.* Linn. Sp. pl. 499. Hall. Helv. 414. Ström Sundm. I. 133.
Norvegis *Mikkelsbær, Skindryder, Blokkebær*, Ström. *Böller, Böllebær*, Kyll. Germanice *Trunkelbeeren.* Rupp.
Locus. Vulgaris in utriusque regni uliginoſis.

Tab. CCXXXII.

Orobanche quæ Hypopithys dici poteſt. C. B. Prodr. 31.
Orobanche verbaſculi odore. Plot. Oxon. 146. t. 9. f. 6. Plukn. t. 209. f. 5.
Orobanche Hypopithys lutea. Mentz. pug. 3. f. 5. Moriſ. III. 503. 12. 13. & 504. 20. f. 12. t. 16. f. 13. & 20.
Monotropa, hypopithys, *floribus lateralibus octandris; terminali decandro.* Linn. Sp. pl. 555. fl. ſv. 351. Phil. bot. §. 178.
Locus. Rara, in ſylva Promontorii Monenſis, in ſylvæ Fridrichsdalinæ parte circum ſepta, ubi lectum hoc quod pictum eſt exemplar benevolus communicavit clar. Dn. Muller, Faunae Fridrichsdalinæ auctor.

Tab. CCXXXIII.

Medica flavo flore. Cluſ. Hiſt. CCXLIII.
Trifolium ſylveſtre luteum, ſiliqua cornuta. C. B. P. 330. Kyll. Vir.
Medicago, falcata, *pedunculis racemoſis, leguminibus lunatis, caule proſtrato.* Linn. Sp. pl. 1096. Act. Stockholm. 1742. p. 191.
Locus. Paſſim in graminoſis apricis ſiccis, omnium copioſiſſime in agrorum limitibus circa Hammershuus Bornholmiæ.

Tab. CCXXXIV.

Tamarix. Fuchſ. Hiſt. 513.
Tamarix fruticoſa germanica. C. B. P. 485. Cluſ. Pann.27. cum nomine Myricæ. Lob.Ic.II. 218.
Tamarix, germanica, *floribus decandris.* Linn. Sp. pl. 387: Hall. Helv. 419.
Germanice *Tamariſken.*
Locus. Copioſe in *Leerdalen* Provinciæ Bergenſis, in inſulis fluvii ſolo glareoſo.

Tab. CCXXXV.

Orchis alba bifolia minor, calcari oblongo. C. B. P. 83. Kyll. Vir. Vaill. Pariſ. t. 30. f. 7. Segu. Ver. t. 15. f. 10.
Orchis radicibus conicis, labello lingulato, ſimpliciſſimo. Hall. Helv. 266.
Orchis, bifolia, *bulbis indiviſis, nectarii labio lanceolato integerrimo : cornu longiſſimo, petalis patentibus.* Linn. Sp. pl. 1331.
Norvegis Liſterenſibus *Rams.* Aggershuſenſibus *Valmöeſiſter*, i. e. Convallariæ affinis.
Locus. Vulgaris in utriusque regni ſylvis.

Tab. CCXXXVI.

Juncus alpinus capitulo lanuginoſo. C. B. Prodr. 23. 10. Theatr. 188. Scheuchz. Agroſt. 302. t. 7. f. 1.
Eriophorum, vaginatum, *culmis vaginatis teretibus ſpica ſcarioſa.* Linn. Sp. pl. 76. fl. ſv. 50. Schreb. Gram. 64.
Locus. Norvegiæ paludes ceſpitoſæ alpinæ & ſubalpinæ.

Tab. CCXXXVII.

Gramen aquaticum fluitans multiplici ſpica. C. B. Theatr. 41. *fluviatile.* Kyll. Vir. Scheuchz. Agr. 199.
Feſtuca, fluitans, *panicula ramoſa erecta, ſpiculis ſubſeſſilibus teretibus muticis.* Linn. Sp. pl. 111. It. Scan. 349. Ström Sundm. I. 89. Schreb. Gram. 48. Stillingfl. tracts. 387. f. 10.
Danis *Mannagræs.* Germanis *Entengraſs.* Trag. *Schwadengraſs.* v. Bergen Francof. *Mannagraſs.*
Locus. Vulgatiſſimum ubique in foſſis & pratis udis ſolo argilloſo, in utroque regno.

Tab. CCXXXVIII.

Gramen pratenſe criſtatum. C. B. Prodr. 8. Kyll. Vir.
Cynoſurus, criſtatus, *bracteis pinnatifidis.* Linn. Sp. pl. 105. Schreb. Gram. 54. Stillingfl. tracts. 390. t. 11.
Locus. Vulgare in pratis.

Tab. CCXXXIX.

Gramen arundinaceum enode minus ſylvaticum. C. B. Theatr. 97. Scheuchz. Agr. 209. Kyll. Vir. p. 61. init.
Aira, cœrulea, *foliis planis, panicula coarctata, floribus pedunculatis muticis convoluto ſubulatis.* Linn. Sp. pl. 95. fl. ſv. 67. Ström Sundm. I. 69. Schreb. Gram. 39.
Locus. Vulgare locis uliginoſis ceſpitoſis.

Tab. CCXL.

Gramen ſegetum panicula-arundinacea. C. B. Theatr. 35. Scheuchz. Agr. 244.
Aira, ceſpitoſa, *foliis planis, panicula patente, petalis baſi villoſis ariſtatisque: ariſta recta brevi.* Linn. Sp. pl. 96. Ström Sundm. I. 69. Schreb. Gram. 40.
Locus. Vulgatiſſimum in pratis.

HAFNIÆ, typis C. PHILIBERT.
Proſtat apud Auctorem & Bibliopolas PHILIBERT & Viduam MUMME.














Flora Danica Tab. CLXXXVI.



Flora Danica Tab. CLXXXVII.



Flora Danica Tab. CLXXXVIII.



Flora Danica Tab. CLXXXIX.



Flora Danica Tab. CXC.



Flora Danica Tab. CXCI.



Flora Danica Tab. CXCII.












Flora Danica Tab. CXCVII.












Flora Danica Tab. CCII.





Flora Danica Tab. CCIV.



Flora Danica Tab. CCV




Flora Danica Tab. CCVI.







Flora Danica Tab. CCIX.



Flora Danica. Tab. CCX.





Flora Danica Tab. CCXII.



Flora Danica Tab. CCXIII.



Flora Danica Tab. CCXIV.






Flora Danica Tab. CCXVI.















Flora Danica Tab. CCXXIII.






Flora Danica Tab. CCXXV.




Flora Danica Tab. CCXXVI.




Flora Danica Tab. CCXXVII.



Flora Danica Tab. CCXXVIII.










Flora Danica Tab. CCXXXII.









Flora Danica Tab. CCXXXVI.



Flora Danica Tab. CCXXXVII



Flora Danica Tab. CCXXXVIII.



Flora Danica Tab. CCXXXIX.





FLORÆ DANICÆ
ICONUM
FASCICULUS QUINTUS.

MDCCLXVI.

NOMENCLATURA
ET
LOCI NATALES PLANTARUM,
quas quintus hic Faſciculus exhibet.

Tab. CCXLI.

Saxifraga foliorum crenis albis, mollioribus, maxima ſpica, ramulis duplicato ramoſis. Hall. Helv. 401. 7.
Saxifraga, cotyledon, *foliis radicalibus aggregatis lingulatis cartilagineo ſerratis, caule paniculato.* Linn. Sp. pl. II. 570. e. Ström. Sundm. I. 122.
Ab aliis ſynonymis ſtudio abſtineo hoc quidem loco, ob earum ambiguitatem & varietatum numerum.
Sundmörenſibus *Field Roſe.* Ström.
Locus. In Alpium Norvegicarum præruptis ſaxis.

Tab. CCXLII.

Lychnis Sylveſtris IX. Cluſii Hiſt. 291.
Lychnis montana viſcoſa alba latifolia. C. B. P. 205. *foliis brevi lanugine adſperſis.* Kyll. Virid.
Viſcago foliis imis petiolatis, petalis bifidis ſe convolventibus. Hall. Helv. 374.
Silene, nutans, *petalis bifidis, floribus lateralibus ſecundis cernuis, panicula nutante.* Linn. Sp. pl. II. 596. Fl. Sv. 388.
Locus. Daniæ Paſcua ſicca.

Tab. CCXLIII.

Coronopus maritimus major. C. B. P. 190. *Plantago marina.* Kyll. Virid.
Plantago, maritima, *foliis ſemicylindraceis integerrimis; baſi lanatis, ſcapo tereti.* Linn. Sp. pl. II. 165. Ström. Sundm. I. 114.
Locus. Vulgaris in littoribus maritimis.

Tab. CCXLIV.

Thalictrum, minus, *foliis ſexpartitis, floribus cernuis.* Linn. Sp. pl. II. 769. It. Gothl. 180. Convenit cum deſcriptione in Itinere Gothlandico: de aliis ſynonymis non liquet.
Locus. In Parœcia *Toten* Norvegiæ, in paſcuis ad lapidum acervulos.

Tab. CCXLV.

Salix latifolia rotunda. C. B. P. 474. Kyll. Vir.
Salix foliis ovatis ſericeis, julis craſſiſſimis. Hall. Gœtt. 9.
Salix, caprea, *foliis ovatis rugoſis: ſubtus tomentoſis, undatis, ſuperne denticulatis.* Linn. Sp. pl. II. 1448. Ström. Sundm. I. 121.
Norvegis & Danis *Selje.*
In Daniæ & Norvegiæ ſiccis pratis & ſylvis.

Tab. CCXLVI.

Sium, Dod. pemt. 589. *latifolium* C. B. P. 154. Kyll. Vir. Riv. pentap. 78.
Sium, latifolium, *foliis pinnatis, umbellis terminalibus.* Linn. Sp. pl. II. 361. Hall. Helv. 435.
Vulgaris in Daniæ rivulis & ad ripas paludoſas.

Tab. CCXLVII.

Sium aquaticum procumbens ad alas floridum. Moriſ. hiſt. III. 283. ſ. 9. t. 5. f. 3.
Sium minus. Riv. pentap. 79.
Sium, nodiflorum, *foliis pinnatis, umbellis axillaribus ſeſſilibus.* Linn. Sp. pl. II. 361. Hall. Helv. 435.
Germanis *Eppich, Waſſermerck.*
Iisdem cum præcedente locis, minus tamen vulgare.

Tab. CCXLVIII.

Veronica. Cam. epit. 461. *Mas ſupina & vulgatiſſima.* C. B. P. 246. S. Paul. Fl. D. Kyll. Vir. Riv. Tetrap. 93. Blakw. 143.
Veronica foliis ſiccis ovatis ſerratis, caule procumbente, ex alis racemoſa. Hall. Helv. 530.
Veronica, officinalis, *ſpicis lateralibus pedunculatis, foliis oppoſitis, caule procumbente.* Linn. Sp. pl. II. 14. Ström. Sundm. I. 134.
Danis & Norvegis *Veronica, Ehrenpriis.* Sundmörenſibus *Fleſmegræs* Ström. Germanis *Veronica, Ehrenpreiſs.*
Locus. Vulgatiſſima in Norvegia, nec rara in Dania.

Tab. CCXLIX.

Inferiorum figurarum ſiniſtra, foliis latioribus.
Sphagnum acaulon bulbiforme majus & minus Dill. Muſc. 251. 252. t. 32. f. 11. 12. Hall. Helv. 97. 6.
Phaſcum, acaule, *anthera ſeſſili, foliis ovatis acutis conniventibus.* Linn. Sp. pl. II. 1570. Hudſ. Angl. 396.
Figura dextra, foliis ſubulatis.
Sphagnum acaulon trichodes. Dill. Muſc. 251. t. 32. f. 10. Hall. Helv. 97. 8.
Phaſcum, ſubulatum, *acaule, anthera ſeſſili, foliis ſubulatis ſetaceis patulis.* Linn. Sp. pl. II. 1570. Hudſ. Angl. 397.
Utrique certo ſunt calyptræ ſed fugaces.
Locus. Paſſim circa Hafniam ſolo arenoſo, ad aggeres foſſarum & in ericetis.
Tertia ſuperior figura non videtur eſſe niſi idem hoc *Phaſcum ſubulatum* poſt maturitatem exareſcens, ob habitum tamen diverſum juſſi pictorem addere.

Tab. CCL.

Dryopteris nigra. Dod. pempt. 466. *Onopteris maſ.* Ger. Em. 1137.
Aſplenium, adiantum nigrum, *frondibus ſubtripinnatis: foliolis alternis: pinnis lanceolatis inciſo-ſerratis.* Linn. Sp. pl. 1541. Hudſ. Angl. 386.
Locus. In Bornholmia, paſſim in rimis petrarum littoris orientalis.

Tab. CCLI.

Gramen paniculatum maritimum vulgatiſſimum. Raji Syn. III. 409. *vulgatiſſimo pratenſi congener aut ſimile.* Lob. ill. 8.
Poa, maritima, *panicula ſubſpicata, ſpiculis ſecundis coarctatis, foliis convolutis.* Hudſ. Angl. 35. cf. Scheuchz. Agr. 272.
Locus. Vulgare in Daniæ & Norvegiæ littoribus.

Tab. CCLII.

Veronica humilis erecta montana, flore parvo coeruleo. Dill. Giſſ. app. 38.
Veronica, verna, *floribus ſolitariis, foliis digitato partitis pedunculo longioribus.* Linn. Sp. pl. II. 19. Ström. Sundm. I. 135. c. deſcript.
Locus. In Dania & Norvegia, ſatis vulgaris, primo vere, locis ſiccis exaridis.

Tab. CCLIII.

Orchis morio fœmina. C. B. P. 82. Kyll. Vir. Vaill. Pariſ. t. 31. f. 13. 14.
Orchis radicibus ſubrotundis, cucullo clauſo, lineato, labello ampliter trifido, crenato, Hall. Helv. 266.
Orchis, morio, *bulbis indiviſis, nectarii labio quadrifido crenulato: cornu obtuſo, petalis omnibus conniventibus.* Linn. Sp. pl. II. 1333.
Locus. Vulgaris in utriuſque regni pratis.

Tab. CCLIV.

Gnaphalium, a *Sylvatico,* ni fallor, vere diverſum, loco mere alpinum. Paſſim & copioſe in Alpibus Norvegiæ, nec extra alpes. Ex Iſlandia etiam attulit nuper inde redux ornatiſſimus Dn. *Johannes Gerhardus Kœnig,* cujus complures inde allatas pulchras plantas exhibebit faſciculus ſextus. Hoc etiam ſine dubio vidit & intellexit Dn. *Ström. Sundm.* I. 97.

Tab.

Tab. CCLV.

Valeriana græca. Dod. pemt. 352. *cærulea.* C. B. P. 164.
Polemonium, cœruleum, *foliis pinnatis, floribus erectis, calycibus corollæ tubo longioribus.* Linn. Sp. II. 230. Fl. lapp. 86. Hall. Helv. 490.
Locus. In Norvegia, in *Toten,* & in *Valders,* in adſcenſu montis *Griendefield,* ad lapidum acervos.

Tab. CCLVI.

Circæa lutetiana minor Danica. Lob. ill. 89. Kyll. Vir. *Minima.* Col. ecphr. II. 79. t. 80.
Circæa, alpina, *caule adſcendente, racemo unico.* Linn. Sp. II. 14. Hall. Helv. 456. Ström. Sundm. I. 82.
Locus. Vulgaris in Daniæ & Norvegiæ ſylvis, umbroſis humidiuſculis.

Tab. CCLVII.

Selinum paluſtre lacteſcens. C. B. P. 162. Prodr. 85.
Thyſſelium anguſtifolium. Riv. pent. 20.
Selinum leviter lacteſcens, radice unica. Hall. Helv. 443.
Selinum, paluſtre, *ſublacteſcens, radice unica.* Linn. Sp. II. 350.
Locus. In Daniæ paludoſis, frequens in lacunis a ceſpite effoſſo.

Tab. CCLVIII.

Gramen tremulum majus. C. B. P. 2. Kyll. Vir. Scheuchz. agr. 204.
Briza, media, *ſpiculis ovatis, calyce floſculis* (7) *breviore.* Linn. Spec. II. 103. Ström. Sundm. I. 77. Schreb. gr. 41.
Danis & Norvegis *Beſvergræſſ,* Germanis *Zittergraſs.*
Locus. In pratis ſiccioribus vulgatiſſimum.

Tab. CCLIX.

Gramen aquaticum paniculatum, phalaridis ſemine. Scheuchz. Agr. 126.
Phalaris, arundinacea, *panicula oblonga ventricoſa.* Linn. Sp. II. 80. Schreb. gr. 29.
Locus. Vulgare in Dania ad ripas lacuum & fluviorum.

Tab. CCLX.

Sparganium minimum. C. B. P. 15. Kyll. Vir. Raji hiſt. 1910. Syn. III. 437.
Sparganium, natans, *foliis decumbentibus planis.* Linn. Sp. II. 1378. Ström. Sundm. I. 127.
Locus. Vulgare in Siællandiæ lacubus & paludibus.

Tab. CCLXI.

Cyperoides foliis caryophyllæis, ſpicis e rarioribus & tumidioribus veſicis compoſitis. Mich. gen. 61. t. 32. f. 11.
Carex ſpicis maribus gracilibus, fœmininis turgidis & erectis. Hall. Helv. 240.
Carex, panicea, *ſpicis pedunculatis erectis remotis: fœmineis linearibus, capſulis obtuſiuſculis inflatis.* Linn. Sp. II. 1387. Fl. Sv. 853. Ström. Sundm. 80.
Locus. Vulgaris in uliginoſis.

Tab. CCLXII.

Uſnea rigida horſum vorſum extenſa. Dill. Muſc. 66. t. 13. f. 10.
Lichen, chalybeiformis, *filamentoſus ſubramoſus decumbens, implicato flexuoſus.* Linn. Sp. II. 1623.
Locus. Vulgaris in alpibus Norvegiæ.

Tab. CCLXIII.

Lichenoides ſubtus croceum, peltis adpreſſis. Dill. 221. t. 30. f. 120.
Lichen alpinus viridis ſubtus aurantius, ſcutis magnis nigris planiſſimis. Hall. Helv. 74.

Lichen, croceus, *foliaceus repens ſubrotundus planus ſubtus venoſus villoſus croceus, peltis ſparſis adnatis.* Linn. II. 1616. Fl. Lapp. 443. t. 11. f. 3.
Locus. In alpium Norvegicarum ſummis culminibus in humo uda.

Tab. CCLXIV.

Fungus minimus flaveſcens infundibuli forma. C. B. P. 373. Kyll. Vir. Vaill. Pariſ. t. 11. f. 10.
Agaricus, cantharellus, *ſtipitatus, lamellis ramoſis decurrentibus.* Linn. Sp. II. 1639. Ström. Sundm. I. 67. Gleditſch. fung. 103. 12.
Locus. In Daniæ & Norvegiæ pratis ſylvaticis. Copioſe circa *Jægerspriis.*

Tab. CCLXV.

Rhamnus ſalicis folio anguſtiore, fructu flaveſcente. C. B. P. 477. Kyll. Vir.
Hippophaë, rhamnoides, *foliis lanceolatis.* Linn. Sp. II. 1452.
Norvegis *Tinveed.*
Locus. In Dania, ad *Stevens Klint* copioſe. In Norvegia in Inſula *Toutteröen* ſinus Nidroſienſis, & in *Næröen* Nummedaliæ.

Tab. CCLXVI.

Orchis palmata pratenſis latifolia, longis calcaribus. C. B. P. 85. Kyll. Vir. Vaill. Pariſ. t. 31. f. 1—4.
Orchis radicibus palmatis, calcare craſſo, foliis maculoſis, caule fiſtuloſo. Hall. Helv. 272. 27.
Orchis, latifolia, *bulbis ſubpalmatis rectis, nectarii cornu conico: labio trilobo lateribus reflexo, bracteis flore longioribus.* Linn. Sp. II. 1334. Fl. Sv. II. 801.
Danis *Gudshaand*, Norvegis *Marihaand.*
Locus. Vulgaris in pratis utriuſque regni.

Tab. CCLXVII.

Helleborine latifolia, floribus magnis paucis albisque. Hall. Helv. 276.
Locus. Paſſim rarior in Daniæ pratis ſylvaticis ſubuliginoſis.
Epipactis palustris. W.

Tab. CCLXVIII.

Chamelæa ſeu Mezereon. Trag. hiſt. 959. Dod. pemt. 364.
Thymelæa floribus ſpicatis ſub foliis ellipticis, modice acuminatis, lævibus mollibusque. Hall. Helv. 188.
Daphne, Mezereum, *floribus ſeſſilibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis.* Linn. Sp. II. 509. Fl. Sv. II. 338.
Norvegis *Tisbaſt*, *Kellerhals.* Germanis *Seidelbaſt*, *Kellerhals.*
Locus. Rarius in Norvegiæ ſylvis, e. g. Inſulæ *Malmöe* ſinus Chriſtianenſis.

Tab. CCLXIX.

Gentiana IIII. Cluſ. Hiſt. 313.
Gentiana paluſtris anguſtifolia. C. B. P. 188. Kyll. Vir.
Gentiana, pneumonanthe, *corollis quinquefidis campanulatis, oppoſitis pedunculatis, foliis linearibus.* Linn. Sp. II. 330. Hall. Helv. 477. 10.
Germanice *Lungenblumen.* Bœhm. Lipſ.
Locus. Ipſe legi in vicina Scania, ceterum Daniæ & Holſatiæ indigenam.

Tab. CCLXX.

Juncus alpinus latifolius, panicula racemoſa nigricante pendula. Till. Piſ. 91.
Juncus, ſpicatus, *foliis planis, ſpica racemoſa nutante.* Linn. Sp. II. 469.
Locus. In Norvegiæ alpibus, non frequens.

Tab. CCLXXI.

Alſine hederacea montana maxima. Col. ecphr. 289. t. 290.
Alſine altiſſima nemorum. C. B. P. 250. Kyll. Vir.

Stellaria

Stellaria, nemorum, *foliis cordatis petiolatis, paniculæ pedunculis ramoſis.* Linn. Sp. pl. II. 603. Fl. Sv. II. 391. Ström Sundm. I. 129.
Locus. Daniæ & Norvegiæ nemora.

TAB. CCLXXII.

Herba ſtella ſeu cornu cervinum. Dod. pemt. 109.
Coronopus ſylveſtris hirſutior. C. B. P. 190. Kyll. Vir.
Plantago, coronopus, *foliis linearibus dentatis, ſcapo tereti.* Linn. Sp. pl. II. 166.
Locus. Vulgaris in Daniæ campeſtribus, glareoſis, viis, copioſe in Amak.

TAB. CCLXXIII.

Juncus capitulo equiſeti major. C. B. P. 12. Kyll. Vir.
Scirpus equiſeti capitulo majore. Scheuchz. Agr. 360.
Scirpus, paluſtris, *culmo tereti nudo, ſpica ſubovata terminali.* Linn. Sp. pl. II. 70. Ström. Sundm. I. 124.
In figura ſingularis floris antheram quartam vagam & ſuperfluam B. L. deleat.
Locus. Vulgaris in foſſis & inundatis.

TAB. CCLXXIV.

Lichen pileatus Plinii primus. Col. ecphr. 330. t. 331. Mich. Gen. 3. t. 2. f. 1.
Lichen vulgaris pileatus & verrucoſus. Dill. Muſc. 516. t. 75. f. 1.
Marchantia, conica, *calyce communi quinqueloculari ſubovato.* Linn. Sp. II. 1604.
Locus. Locis umbroſis, ad ſaxa & ripas elevatas, in Norvegia & Dania, e. g. circa *Fridrichsdal*, unde attulit Dn. *Müller.*

TAB. CCLXXV.

Lichenaſtrum aquaticum fluitans tenuifolium furcatum. Dill. Muſc. 513. t. 74. f. 47. Vaill. Pariſ. t. 19. f. 3.
Riccia, fluitans, *frondibus dichotomis, lineari filiformibus.* Linn. Sp. II. 1606.
Locus. Paſſim in foſſis, aquæ innatans, copioſiſſima circa *Nykiöping* in Odsherred in lacanis a ceſpite effoſſo.

TAB. CCLXXVI.

Fucus, ramoſiſſimus, ramis vagis approximatis teretibus, veſicis ſolidis, ſparſis, caulinis.
Locus. Copioſe in ſinu *Stavangrenſi.*

TAB. CCLXXVII.

Vicia ſylveſtris major multiflora floribus albis ſtriatis. Kyll. Vir. Plukn. t. 71. f. 1.
Vicia foliis ovatis, ſiliquis racemoſis pendulis. Hall. Helv. 599. t. 14. Gœtt. 295.
Vicia, ſylvatica, *pedunculis multifloris, foliolis ovalibus, ſtipulis denticulatis.* Linn. Sp. pl. II. 1035. Ström. Sundm. I. 136.
Locus. Satis frequens in ſylvis Daniæ & Norvegiæ.

TAB. CCLXXVIII.

Frangula. Dod. pemt. 784.
Alnus nigra baccifera. C. B. P. 428. Kyll. Vir.
Rhamnus, frangula, *inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis.* Linn. Sp. pl. II. 280. Ström. Sundm. I. 119.
Danis *Törſtetræ.* Sundmörenſibus *Hundweed.* Germanis *Faulbaum, Pinnholz, Zapfenholz.*
Locus. In Daniæ & Norvegiæ nemoribus.

TAB. CCLXXIX.

Succiſa ſeu morſus Diaboli. Cam. epit. 397. C. B. P. 269. Kyll. Vir. p. 101.
Scabioſa, ſucciſa, *corollulis quadrifidis æqualibus, caule ſimplici, ramis approximatis, foliis lanceolato ovatis integerrimis.* Linn. Sp. pl. II. 142. Ström. Sundm. I. 123.
Danis *Engeknop, Blaaknop, Dievelsbid.* Sundmörenſibus *Skore, Grönblad.* Germanis *Abbiſs, Teufelsabbiſs.*
Locus. Vulgatiſſima in paſcuis & pratis.

Tab. CCLXXX.

Gramen arundinaceum panicula molli ſpadicea. C. B. P. 7. Scheuchz. Agr. 122. t. 5.
Arundo, calamagroſtis, *calycibus unifloris, culmo ramoſo.* Linn. Sp. pl. II. 121.
Locus. Paſſim in pratis nemoroſis ad foſſas.

Tab. CCLXXXI.

Serratula, Dod. pemt. 42. *foliis integris, & inciſis.* C. B. P. 235. Kyll. Vir.
Serratula, tinctoria, *foliis lyrato pinnatifidis: pinna terminali maxima, floſculis conformibus.* Linn. Sp. pl. II. 1144.
Danis *Engeſkier.* Germanis *Schartenkraut*, *Färber-Scharten.*
Locus. Paſſim in Daniæ pratis nemoroſis humidis, copioſe in *Bornholm.*

Tab. CCLXXXII.

Potamogeton ſalicis folio. C. B. P. 193. Kyll. Vir.
Perſicaria foliis ſerratis, ſpica denſa cylindrica. Hall. Helv. 180. Rupp. Jen. 98.
Polygonum, amphibium, *floribus pentandris ſemidigynis, ſtaminibus corolla longioribus.* b. Linn. Sp. pl. II. 517. Ström. Sundm. I. 115.
Locus. Vulgaris in Dania & Norvegia, fluitans in foſſis & paludibus.

Tab. CCXXXLIII.

Sanicula officinarum. C. B. P. 319. Kyll. Vir.
Sanicula, europæa, *foliis radicalibus ſimplicibus, floſculis omnibus ſeſſilibus.* Linn. Sp. pl. II. 339. Ström. Sundm. I. 122.
Danis *Sanikel.* Germanis *Sanickel*, *Tranickel*, *Bruchkraut.*
Locus. Vulgaris in Daniæ, rarior in Norvegiæ ſylvis.

Tab. CCLXXXIV.

Gramen cyperoides ſpicatum minimum, ſpica divulſa aculeata. Scheuchz. Agr. 485.
Carex, muricata, *ſpiculis ſubovatis ſeſſilibus remotis androgynis, capſulis acutis divergentibus ſpinoſis.* Linn. Sp. pl. II. 1382. Ström. Sundm. I. 80.
Locus. Vulgaris in Daniæ & Norvegiæ paſcuis udis nemoroſis.

Tab. CCLXXXV.

Carex, caneſcens, *ſpiculis ſubrotundis remotis ſeſſilibus obtuſis androgynis, capſulis ovatis obtuſiuſculis.* Linn. Sp. pl. II. 1383.
Locus. In Norvegiæ & Daniæ paluſtribus.

Tab. CCLXXXVI.

Fucus ſpiralis maritimus major. Raj. Syn. III. 41.
Fucus, ſpiralis, *fronde dichotoma integra, caule folium percurrente; inferne nudo, veſiculis verrucoſis terminalibus.* Linn. Sp. pl. II. 1627. Hudſ. Angl. 467. Ström. Sundm. I. 90.
Locus. In oceano Norvegico.

Tab. CCLXXXVII.

Juncus minimus ſpica breviore ſquamoſa ſpadicea. Scheuchz. Agr. 364. t. 7. f. 19.
Scirpus, acicularis, *culmo tereti nudo ſetæformi, ſpica ovata terminali bivalvi, feminibus nudis.* Linn. Sp. pl. II. 71. Hall. Helv. 249. 9.
Hæc itaque nomina removere oportet a tabula 167, de quo ſcirpo nondum ſatis liquet. cf. Hall. Helv. 249. 6.
Locus. In Dania rarius ad ripas fluviorum & lacuum.

Tab. CCLXXXVIII.

Fungus minimus lignoſus, diſco punctato. Bocc. Muſ. II. t. 107.
Elvela VII. Gleditſch. Fung. 44.
Peziza, punctata, *turbinato truncata, diſco punctato.* Linn. Sp. pl. II. 1650. Fl. Sv. II. 1275. Hudſ. Angl. 499.
Locus. In ſtercore in paſcuis & campis ſicceſcente.

Tab.

Tab. CCLXXXIX.

Lyſimachia chamænerion dicta. C. B. P. 245. Kyll. Vir.
Epilobium, anguſtifolium, *foliis ſparſis lineari lanceolatis, floribus inæqualibus.* Linn. Sp. pl. II. 493. Ström. Sundm. I. 86. Hall. Helv. 409. 1.
Sundmörenſibus *Giedſke, Geedſkoe Græs, Mieldegræs.* Germanis *Weiderich Röslein.* Rupp.
Locus. Rarius in Dania, frequens in Norvegiæ ſylvis cæduis, agrisque, agricolis moleſtum.

Tab. CCXC.

Allium montanum bicorne latifolium. C. B. P. 74. Kyll. Vir.
Allium ſtaminibus alterne trifidis, capite bulbifero, foliis gramineis leviter ſerratis. Hall. Opuſc. 336.
Allium, ſcorodopraſum, *caule planifolio bulbifero, foliis crenulatis: vaginis ancipitibus, ſtaminibus tricuſpidatis.* Linn. Sp. pl. II. 425. Fl. Sv. 278.
Locus. Paſſim in Dania, potiſſimum in dumetis parvarum inſularum.

Tab. CCXCI.

Lilium convallium minus. C. B. P. 304. Kyll. Virid.
Convallaria, bifolia, *foliis cordatis.* Linn. Sp. pl. II. 452. Ström. Sundm. I. 83. Mill. Ic. t. 101. f. 2.
Locus. Paſſim in nemoribus Daniæ & Norvegiæ.

Tab. CCXCII.

Aſteri montano purpureo ſimilis ſ. globulariæ. J. B. II. 1047.
Erigeron, uniflorum, *caule unifloro, calyce piloſo.* Linn. Sp. pl. II. 1211. Fl. lapp. 307. t. 9. f. 3. Ström. Sundm. I. 88. Hall. Helv. 724.
Specimina caule ſubbifloro ex Iſlandia attulit Dn. *Kœnig,* ſane ſpecie non diverſa.
Locus. Alpes Norvegiæ, & Iſlandiæ.

Tab. CCXCIII.

Feſtuca graminea, juba effuſa. Scheuchz. Agr. 262.
Bromus, arvenſis, *panicula nutante, ſpiculis ovato oblongis.* Linn. Sp. pl. II. 113. Fl. Sv. II. 97.
Locus. Frequens in agris.

Tab. CCXCIV.

Gramen cyperoides, ſpica e pluribus ſpicis mollibus compoſita. Scheuchz. Agr. 456.
Carex, leporina, *ſpica compoſita, ſpiculis ovatis ſeſſilibus approximatis alternis androgynis nudis.* Linn. Sp. pl. II. 1381. Fl. Sv. II. 837. Ström. Sundm. I. 80.
Locus. Paſſim in pratis humidioribus.

Tab. CCXCV.

Polytrichum quadrangulare, juniperi foliis brevioribus & rigidioribus. Dill. Muſc. 424. t. 54. f. 2.
Polytrichum, commune, b, *caule ſimplici, anthera parallelepipeda.* Linn. Sp. pl. II. 1573.
Locus. In Norvegiæ paſcuis ſubalpinis.

Tab. CCXCVI.

Polytrichum alpinum ramoſum, capſulis e ſummitate ellipticis. Dill. Muſc. 427. t. 55. f. 5. Hall. Helv. 107. 3. t. 3. f. 6.
Polytrichum, alpinum, *caule ramoſiſſimo, pedunculis terminalibus.* Linn. Sp. pl. II. 1573. Hudſ. Angl. 400, qui cum urnigero recte, ut videtur, jungit.
Locus. In Norvegiæ paſcuis ſubalpinis.

Tab. CCXCVII.

Polytrichum ramoſum, foliis ſubulatis margine lævibus, capſula ovali, roſtello capituli uncinato.
Locus. Norvegiæ paſcua ſubalpina.

Tab. CCXCVIII.

Bryum paluſtre, ſcapis teretibus ſtellatis, capſulis magnis ſubrotundis. Dill. Muſc. 340. t. 44. f. 2.
Mnium, fontanum, *caule ſimplici geniculis inflexo.* Linn. Sp. pl. II. 1574.
Locus. Paſſim in Norvegia & Dania, ad ſcaturigines frigidas.

Tab. CCXCIX.

Mnium perangustis & brevibus foliis. Dill. Muſc. 230. t. 31. f. 1.
Mnium, androgynum, *caule ramoſo, androgynum.* Linn. Sp. pl. II. 1574.
Locus. In umbroſis udis Sylvarum ad truncos arborum.

Tab. CCC.

Mnium ſerpylli foliis tenuibus pellucidis. Dill. Muſc. 231. t. 31. f. 2.
Mnium, caule ſimplici, foliis ovatis. Linn. Sp. pl. II. 1574.
Locus. In umbroſis udis.

MONITUM.

Monentibus multis, etiam Bibliopegis, nimis ſpiſſum & inconcinnum fore volumen, quod comprehenderet quinque faſciculos ſeu tabulas tercentum, quippe folia ſingularia ſeu dimidiatas plagulas, quas agglutinare oportet novæ chartæ antequam conſuuntur, nec malleo compactiores reddere licet, judicavimus tres faſciculos juſto volumini ſufficere poſſe, ideoque nunc offerimus duos titulos generales, voluminis primi & ſecundi, quod ſextus faſciculus proximo anno claudet.

Ceterum his generalibus titulis pro lubitu quiſque aut uti poteſt, aut ſine damno ſuo eos ſeponere, ſi forte animus ſit, quod nos quidem ſuademus, herbarii in modum incompactas aſſervandi tabulas has, aut ſi magis arriſerint ſive ſpiſſiora volumina quaternorum quinorumve faſciculorum, ſive graciliora binorum ſingulorumque, nam unius cujusvis ſingularis faſciculi titulus ſatis plenus eſt, ut generaliori nullo egeat, & citationes tabularum fiunt commemoratione numerorum illis inſcriptorum & continua ſerie pergentium, nomenclaturam denique, quæ interim additur faſciculis, donec catalogus ſyſtematicus plantarum danicarum, cum deſcriptionibus & ſynonymia ampliore, exſtabit, poſt aliquot annos edendus iſte catalogus ſuperfluam reddet.

HAFNIÆ, typis C. PHILIBERT.

Proſtat apud Auctorem, & Bibliopolas Philibert & Viduam Mumme.











Flora Danica Tab. CCXLVI.






Flora Danica Tab. CCXLVIII.



Flora Danica Tab. CCXLIX.













Flora Danica Tab. CCLV.





Flora Danica Tab. CCLVII.



Flora Danica Tab. CCLVIII.



Flora Danica Tab. CCLIX.



Flora Danica Tab. CCLX.







Flora Danica Tab. CCLXIII.



Flora Danica Tab. CCLXIV.









Flora Danica Tab. CCLXVIII.








Flora Danica Tab. CCLXXI.



Flora Danica Tab. CCLXXII.



Flora Danica Tab. CCLXXIII.



Flora Danica Tab. CCLXXIV.




Flora Danica Tab. CCLXXV.



Flora Danica Tab. CCLXXVI.





Flora Danica Tab. CCLXXVIII.





Flora Danica Tab. CCLXXX



Flora Danica Tab. CCLXXXI.



Flora Danica Tab. CCLXXXII.



Flora Danica Tab. CCLXXXIII.






Flora Danica Tab. CCLXXXV.



Flora Danica Tab. CCLXXXVI.



Flora Danica Tab. CCLXXXVII.











Flora Danica Tab. CCXCI.







Flora Danicá Tab. CCXCIV.



Flora Danica Tab. CCXCV.



Flora Danica Tab. CCXCVI.



Flora Danica Tab. CCXCVII.





Flora Danica Tab. CCXCIX.



Flora Danica Tab. CCC.



FLORÆ DANICÆ
ICONUM

FASCICULUS SEXTUS.

MDCCLXVII.

NOMENCLATURA
ET
LOCI NATALES PLANTARUM,
quas ſextus hic Faſciculus exhibet.

Tab. CCCI.

Aria. Cluſ. Hiſt. 9. Lugd. 202. male cum flore quadrifido, quæ repetita minor, cum nomine *ſorbi alpinæ*, J. B. I. 65.
Alni effigie lanato folio major. C. B. P. 452.
Cratægus, Aria, *foliis ovatis inæqualiter ſerratis, ſubtus tomentoſis.* Linn. Sp. pl. 681. Du Hamel arbr. I. 194. 4. 196*. f. 4.
Liſterenſibus *Maabær.* Bornholmenſibus *Mölnebærtræ.* Thurah. Bornh. 35.
Locus. *Herreds-Sogn*, Parœciæ *Vandſöe*, in Liſter Norvegiæ. Etiam in Bornholmia, ſed rarius.

Tab. CCCII.

Ramus florigerus.

Sorbus alpina foliis ſinuoſis. Kyll. Virid.
Cratægus, aria, *foliis ellipticis ſerratis tranſverſaliter ſinuatis, ſubtus villoſis.* Linn. Sp. pl. 681. Ström. Sundm. I. 83. Pontopp. H. N. N. I. 212. 235. tab. 9. Thurah. Bornh. 35. Gunner. fl. Norv. 211.
Norvegis *Aſaldbær. Öxel*, eller *Aſaldbær* Pont. Sundmörenſibus *Selje Aſald.* Kyllingio *Axelbær, Borringholms Roſiner.*

Ramus fructiferus.

Sorbus, hybrida, *foliis ſemipinnatis, ſubtus tomentoſis.* Linn. Sp. pl. 684. fl. ſv. 2. 433. c. Ström. Sundm. I. 84. Gunner. fl. Norv. 211.
Sundmörenſibus *Rogn Aſald.*
Locus. Paſſim in Norvegia & Bornholmia, prior varietas copioſe potiſſimum in *Norderhough Ringericiæ*, poſterior in *Bielland* prope domum paſtoris, ibi plantata.

Tab. CCCIII.

Salicornia Dodon. pemt. 82.
Kali geniculatum majus. C. B. P. 289. Kyll. Vir. Petiv. herb. brit. t. 9. f. 3.
Salicornia, herbacea, europæa, *patula, articulis apice compreſſis emarginato bifidis.* Linn. Sp. pl. 5. fl. ſv. 1. Ström. Sundm. I. 121. Gunn. fl. Norv. 274.
Kyllingio *Salturt*, *Glaſſurt.*
Locus. Vulgaris ubique in littoribus maritimis ſolo pingui.

Tab. CCCIV.

Atriplex maritima Halimus dicta erecta, ſemine folliculis membranaceis bivalvibus, in latitudinem porrectis, & utrinque recurvis, longo pedunculo inſidentibus, clauſo. Plukn. Almag. 61. t. 36. f. 1. cf. J. B. I. b. 229. Raj. Syn. III. 153. Petiv. herb. brit. t. 7. f. 8.
Atriplex incana, caule annuo palmari, fructibus ſeſſilibus & aliis longe pedunculatis. Mœhring. Comm. Nor. 1744. p. 31.
Atriplex, pedunculata, *caule herbaceo divaricato, foliis lanceolatis obtuſis integris, calycibus fœmineis pedunculatis.* Linn. Sp. pl. 1675. Amœn. IV. 296. Hudſ. Angl. 378.
Locus. Paſſim in Daniæ, Holſatiæ & Oldenburgi littoribus maritimis pinguibus. Circa *Peſthuus* prope Hafniam, prope *Corſöer.*

Tab. CCCV.

Parietaria ſylveſtris I. Cluſ. hiſt. 2. 44.
Melampyrum coma cærulea. C. B. P. 234. Kyll. Vir. *M. Sylvaticum* Riv. 81.
Melampyrum, nemoroſum, *floribus ſecundis lateralibus: bracteis cordatis dentato lanceolatis: ſummis coloratis ſterilibus, calycibus lanatis.* Linn. Sp. pl. 843.
Kyllingio *Koebvede med blaa Toppe.* Germ. *Tag und Nacht.* Bœhm.
Locus. Vulgaris in Daniæ nemoribus.

Tab. CCCVI.

Gramen marinum ſpicatum. Lob. ic. 16.
Gramen ſpicatum alterum. C. B. P. 6. theatr. 82. *Gr. junceum ſpicatum maritimum.* Kyll. Vir.

 Triglo-

Triglochinum, maritimum, *capſulis ſexlocularibus ovatis.* Linn. Sp. pl. 483. Act. Stockh. 1742. 147. t. 6. f. 4. 5. Ström. Sundm. I. 132. Gunn. fl. Norv. 153.
Svecis *Sælting*, Act. Stockh. l. c.
Locus. Vulgaris in paſcuis maritimis.

Tab. CCCVII.

Gramen cyperoides miliaceum. C. B. P. 6. theatr. 90. Kyll. Vir.
Cyperus gramineus. J. B. II. 504. Scheuchz. agroſt. 393.
Scirpus, ſylvaticus, *culmo triquetro folioſo, umbella foliacea, pedunculis nudis ſupradecompoſitis, ſpicis confertis.* Linn. Sp. pl. 75.
Locus. Paſſim in paludibus ſylvarum umbroſarum.

Tab. CCCVIII.

Gramen cyperoides paluſtre majus ſpica compacta. C. B. P. 6. Moriſ. hiſt. III. 244. f. 8. t. 12. f. 24.
Carex, vulpina, *ſpica ſupradecompoſita inferne laxiore: ſpiculis androgynis ovatis ſeſſilibus glomeratis: ſuperne maſculis.* Linn. Sp. pl. 1382.
Locus. Paſſim in pratis humidis, & ſylvaticis.

Tab. CCCIX.

Viola martia purpurea, flore ſimplici odoro. C. B. P. 119. Kyll. Vir. Dod. pemt. 156.
Viola, odorata, *acaulis, foliis cordatis, ſtolonibus reptantibus.* Linn. Sp. pl. 1324.
Danis *Blaafioler. Marzfioler.* Germ. *Veilgen. Merzviolen.*
Locus. Paſſim in Dania & Holſatia, in nemoribus & ad ſepes, e. g. *Charlottenlund.*

Tab. CCCX.

Erinaceus eſculentus pallide luteus. Mich. Gen. 132. t. 72. f. 3. Gleditſch. fung. 74. 6.
Hydnum, repandum, *ſtipitatum, pileo convexo lævi flexuoſo.* Linn. Sp. pl. 1647. Schæffer. fung. t. 141.
Locus. Minus frequens, in ſylvis, circa *Jægerspriis.*

Tab. CCCXI.

Juncellus omnium minimus. Moriſ. Hiſt. III. 232. f. 8. t. 10. f. 23.
Scirpus, ſetaceus, *culmo nudo ſetaceo, ſpicis lateralibus ſubſolitariis ſeſſilibus.* Linn. Sp. pl. 73. Hudſ. Angl. 18.
Locus. In inundatis paſcuorum maritimorum arenoſorum, e. g. prope *Varel* verſus *Dangaſt*, Oldenburgi.

Tab. CCCXII.

Verbeſina minima. Dill. giſſ. 167. app. 66. Raj. Syn. III. 188. t. 7. f. 2.
Bidens, minima, *foliis lanceolatis ſeſſilibus, floribus femininibusque erectis.* Linn. Sp. pl. 1165. Hudſ. Angl. 310.
Locus. In inundatis ericetorum Holſatiæ, e. g. circa *Kellinghuſen.*

Tab. CCCXIII.

Geniſta. Dod. pemt. 761. Riv. tetrap. 65.
Geniſta anguloſa & ſcoparia. C. B. P. 395. Kyll. Vir.
Spartium, ſcoparium, *foliis ternatis ſolitariisque, ramis inermibus angulatis.* Linn. Sp. pl. 996.
Danis *Geil, Gyſvel.* Kyll. Germanis *Ginſt, Ginſter, Pfriemenkraut, Kühnſchroten.* v. Bergen.
Locus. Vulgatiſſimum in ericetis continentis, in Siællandia in præfectura *Cronenburgenſi.*

Tab. CCCXIV.

Scabioſa media. Dod. pemt. 122.
Scabioſa montana multifido folio, flore cæruleo. Kyll. Vir.
Scabioſa, columbaria, *corollulis quinquefidis radiantibus, foliis radicalibus ovatis crenatis, caulinis pinnatis ſetaceis.* Linn. Sp. pl. 143.
Locus. Paſſim in collibus apricis Siællandiæ, *Stevensklint*, inſula *Kölhöjen* prope *Fridrichsſund.*

Tab. CCCXV.

Valerianæ rubræ ſimilis. Dod. pemt. 351.
Limonium maritimum majus. C. B. P. 192. Kyll. Vir. Petiv. herb. Brit. t. 72. f. 6.
Statice, limonium, *ſcapo paniculato terete, foliis lævibus.* Linn. Sp. pl. 394.
Locus. In littoribus maritimis ſolo pingui, e. g. *Kölhöjen* prope *Fridrichſund*, in inſulis ſinus Othonienſis Fioniæ, omnium copioſiſſime prope *Varel* Oldenburgi.

Tab. CCCXVI.

Braſſica marina ſylveſtris multiflora monoſpermos. Lob. ic. 245.
Braſſica maritima monoſpermos. C. B. P. 112. Kyll. Vir. Petiv. herb. Brit. t. 48. f. 12.
Crambe, maritima, *foliis cauleque glabris.* Linn. Sp. pl. 937. Hudſ. Angl. 260.
Danis *Strandkaal.*
Locus. Paſſim in Daniæ littoribus maritimis glareoſis & ſaxoſis, e. g. *Klint* prope *Nykøping* in Odsherret, *Helgenæs* Fioniæ.

Tab.

Tab. CCCXVII.

Gentiana corolla quinquefida infundibuliformi ſerrata, foliis oblongis. An a *G. Bavarica* Linn. Sp. pl. 331. ſeparanda?

Locus. In *Iſlandia*, circa *Næſſ* & *Beſſeſtedt*, in paſcuis ad littora maris.

Tab. CCCXVIII.

Gentiana corollis quadrifidis imberbibus, pedunculis tetragonis longis terminalibus in caule dichotome ſubramoſo, foliis ovatis.

Locus. In *Iſlandiæ* ſeptentrionalis pratis ſiccioribus copioſe.

Tab. CCCXIX.

Rapuntium montanum capitatum leptophyllum. Col. ecphr. I. 226. t. 227.

Rapunculus ſcabioſæ capitulo cæruleo. C. B. P. 92. Kyll. Vir. Petiv. herb. Brit. t. 55. f. 2.

Jaſione montana. Linn. Sp. pl. 1317. Jacq. Vindob. 289.

Locus. Vulgatiſſima in collibus apricis ſterilibus.

Tab. CCCXX.

Cyperus paluſtris hirſutus minor, paniculis albis. Moriſ. Hiſt. III. 239. ſ. 8. t. 9. f. 39.

Schœnus, albus, *culmo ſubtriquetro folioſo, floribus faſciculatis, foliis ſetaceis.* Linn. Sp. pl. 65.

Locus. Vulgaris in paludibus ceſpitoſis.

Tab. CCCXXI.

Ranunculus hederaceus rivulorum ſe extendens, atra macula notatus. J. B. III. 774.

Ranunculus aquaticus hederaceus. Moriſ. hiſt. 2. 441. ſ. 4. t. 29. f. 29. Kyll. Vir.? Petiv. herb. Brit. t. 38. f. 12.

Ranunculus, hederaceus, *foliis ſubrotundis trilobis integerrimis, caule repente.* Linn. Sp. pl. 781. Hudſ. Angl. 212.

Locus. Paſſim in foſſis ericetorum Holſaticorum & Oldenburgicorum, e. g. circa *Varel* prope viam ad *Dangaſt*, & circa *Segeberg.*

Tab. CCCXXII.

Epilobium, alpinum, *foliis oppoſitis ovato lanceolatis integerrimis, ſiliquis ſeſſilibus, caule repente.* Linn. Sp. pl. 495. Hall. Helv. 409. n. 3. Ström. Sundm. I. 86.

Locus. In irriguis alpium Norvegicarum & Iſlandicarum.

Tab. CCCXXIII.

Burſa paſtoris minor. Dod. pemt. 103. Petiv. herb. Brit. t. 50. f. 2.

Iberis, nudicaulis, *herbacea, foliis ſinuatis, caule nudo ſimplici.* Linn. Sp. pl. 907.

Locus. Vulgaris in campis apricis Daniæ.

Tab. CCCXXIV.

Centaurium paluſtre luteum minimum. Vaill. Pariſ. 32. t. 6. f. 3.

Gentiana, filiformis, *corollis quadrifidis imberbibus, caule dichotomo filiformi.* Linn. Sp. pl. 335. Hudſ. Angl. 88.

Locus. Paſſim in inundatis ericetorum Holſaticorum, e. g. inter *Remmels* & *Hohenweſted*, in ipſa via.

Tab. CCCXXV.

Lathyrus ſylveſtris. Dod. pemt. 523. major. C. B. P. 433. Kyll. Vir.

Lathyrus, ſylveſtris, *pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis enſiformibus, internodiis membranaceis.* Linn. Sp. pl. 1033.

Locus. Non rarus in Dania in dumetis monticulorum.

Tab. CCCXXVI.

Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta magno flore. C. B. P. 245. Kyll. Vir.

Epilobium foliis longis dentatis villoſis flore magno. Hall. Helv. 410.

Epilobium, hirſutum, *foliis oppoſitis lanceolatis, ſerratis, decurrenti amplexicaulibus.* Linn. Sp. pl. 494.

Epilobium, ramoſum, *foliis lanceolatis ſerratis ſubdecurrentibus, inferioribus oppoſitis, caule ramoſo.* Hudſ. Angl. 141.

Locus. Paſſim ad rivulos fonteſque, e. g. *Aue* prope *Neſtved.*

TAB. CCCXXVII.

Chamæleagnus. Dod. pemt. 780.
Rhus myrtifolia belgica. C. B. P. 414. Kyll. Vir. S. Paul. Fl. D.
Myrica, Gale, *foliis lanceolatis ſubſerratis, caule ſuffruticoſo.* Linn. Sp. pl. 1453. Ström. Sundm. I. 108. Gunn. Fl. Norv. 142.
Danis & Norvegis *Pors*, *Poſt.* Germanis *Poſt.*
Locus. Vulgatiſſima in ericetorum paludibus ceſpitoſis.

TAB. CCCXXVIII.

Gentiana autumnalis ramoſa. C.B.P. 188. Kyll. Vir.
Gentiana foliis amplexicaulibus, floris fauce barbata. Hall. Helv. 473.
Gentiana, amarella, *corollis quinquefidis hypocrateriformibus, fauce barbatis.* Linn. Sp. pl. 333. Gunn. Fl. Norv. 95.
Locus. Paſſim in paſcuis Daniæ & Norvegiæ, copioſiſſima circa *Slidre* in Walders. Variat flore quadrifido & quinquefido, ſæpe in eadem ſtirpe, ut tamen quinarius numerus vulgatior ſit, quem mallem ut pictor obſervaſſet in figura ceterum bona.

TAB. CCCXXIX.

Cochlearia britannica ſ. anglica. Lob. ic. 294.
Cochlearia folio ſinuato. C. B. P. 110. Raj. hiſt. 833. Petiv. herb. Brit. t. 49. f. 2.
Cochlearia foliis radicalibus lanceolatis integerrimis, caulinis ſubſinuatis. Miller. Dict.
Cochlearia, anglica, *foliis ovato lanceolatis ſinuatis.* Linn. Sp. pl. 903. Hudſ. Angl. 248.
Locus. Copioſe prope *Varel* Oldenburgi, in littore maris pinqui ſolo.

TAB. CCCXXX.

Campanula cymbalariæ vel hederæ folio. C.B.P. 93. Moriſ. Hiſt. 2. 456. ſ. 5. t. 2. f. 18. Plukn. t. 23. f. 1. Petiv. Gazoph. t. 51. f. 1.
Campanula, hederacea, *foliis cordatis, quinquelobis, petiolatis glabris, caule laxo.* Linn. Sp. pl. 240. Lœfl. it. 127. Hudſ. Angl. 82.
Locus. In *Neuenburg* Oldenburgi, in campo ad diverſorium pertinente, ſolo argilloſo ſabulo mixto, tenui gramine veſtito.

TAB. CCCXXXI.

Ranunculus repens flore in caule ſingulari, foliis varie ſectis. Ammi ruth. 81. t. 13. f. 2. cf. Linn. fl. ſv. 503. & ſupra noſtrâ tab. 144, ubi Ammanni ſynonymon deleatur.
Locus. In *Iſlandia.* In foſſis & rivulis circa *Beſſeſtedt, Örebacke, Adnersöe, Hofsaas.*

TAB. CCCXXXII.

Gnaphalium, latiore folio, caule non ramoſo, ſpica nuda fuſca terminato. Hall. Helv. 701.
Gnaphalium, alpinum, *farmentis procumbentibus, caule ſimpliciſſimo, capitulo terminali aphyllo, floribus oblongis.* Linn. Sp. pl. 1199. fl. ſv. 737.
Locus. In Iſlandiæ alpibus.

TAB. CCCXXXIII.

Orchis bulbis fibroſis, calcare germine breviore, labio tripartito laciniis æqualibus integerrimis.
Locus. In *Iſlandia, Oxeraa Alting.*

TAB. CCCXXXIV.

Polygonum littoreum minus, floſculis ſpadiceo albicantibus. C.B.P. 281. Prodr. 131. Moriſ. Hiſt. 2. 593.
Polygonifolia per terram ſparſa flore ſcorpioides. J. B. III. 379. Dill. Giſſ. app. nov. Gen. 95. t. 3. Tournef. par. I. 218.
Corrigiola, littoralis. Linn. Sp. pl. 388. Hall. Helv. 391.
Locus. In ſabuloſis glareoſis *Sleſvicenſibus*, omnium copioſiſſime in ipſa tota fere via inter *Sleſvic* & *Rendsburg*, ab omni aqua remotiſſima.

Tab. CCCXXXV.

Polygonum parvum flore albo verticillato. J. B. III. 378. Vaill. Pariſ. 157. t. 15. f. 7. Petiv. herb. Brit. t. 10. f. 7.
Illecebra ſpuria vel ſedoides. Rapp. Jen. 99.
Corrigiola. Dill. Giſſ. app. 169.
Illecebrum. Mœhring. Comm. Nor. 1742. p. 4.
Illecebrum, verticillatum, *floribus verticillatis nudis*, *caulibus procumbentibus.* Linn. Sp. pl. 298. Hudſ. Angl. 85.
Locus. Copioſiſſime in Comitatus Oldenburgenſis ſabuloſis ſubinundatis, e. g. in ipſa via *Oldenburgo* ad *Raſtede,* etiam copioſe inter *Sleſvig* & *Rendsburg* cum Corrigiola.

Tab. CCCXXXVI.

Lycopodium paluſtre repens, clava ſingulari. Dill. Muſc. 452. t. 62. f. 7. Vaill. Pariſ. 123. t. 16. f. 11.
Lycopodium, inundatum, *foliis ſparſis integerrimis, ſpicis terminalibus folioſis.* Linn. Sp. pl. 1565. Hudſ. Angl. 394.
Locus. In vivario *Fridrichsruhenſi* Ducatus Holſatiæ, non longe a domo præfecti ſylvæ prope piſcinam.

Tab. CCCXXXVII.

Aloë paluſtris. C. B. P. 286. Kyll. Vir. Petiv. herb. Brit. t. 71. f. 5.
Aloïdes. Bœrh. Lugd. II. 132.
Stratiotes. Zinn in act. Gœtt. III. 425. t. 9. 10. Gœtt. 113.
Stratiotes, aloïdes, *foliis enſiformi triangulis ciliato aculeatis.* Linn. Sp. pl. 754. Hudſ. Angl. 208.
Locus. In aqua pigrius fluente foſſarum & ſtagnorum. Omnium copioſiſſime in regionibus depreſſis, *Marſchen,* Holſatiæ & Oldenburgi. Etiam in Siællandia, in *Farumſöe* & ad Molendinam Chartarum, ſed parcius. Plantas maſculas in prædictis regionibus continentis minime raras, etſi fœminis parciores, in Siællandia nondum obſervavi, iſta autem fœminini floris filamenta, quæ pro ſtaminibus haberi ſolent, vera ſtamina non eſſe palam eſt in floribus maſculinis, in quibus eadem filamenta una cum veris ſtaminibus conſpicere licet.

Tab. CCCXXXVIII.

Piſum ſpontaneum perenne repens humile. Moriſ. Hiſt. II. 47. f. 2. t. 1. f. 5.
Piſum marinum. Raj. Hiſt. 892.
Piſum, maritimum, *petiolis ſupra planiuſculis, caule angulato, ſtipulis ſagittatis, pedunculis multifloris.* Linn. Sp. pl. 1027. It. Weſtg. 190. Hudſ. Angl. 274.
Locus. Paſſim in Daniæ littoribus maritimis glareoſis ſaxoſis, *Klint* prope *Nyeköping* in *Odsherret, Ulshal Monæ.*

Tab. CCCXXXIX.

Nymphæa lutea minor flore fimbriato. J. B. II. 772. C. B. P. 194. Petiv. herb. Brit. t. 71. f. 4.
Menyanthes, nymphoides, *foliis cordatis integerrimis*, *corollis ciliatis.* Linn. Sp. pl. 207. Hudſ. Angl. 71.
Locus. Copioſe in fluvio *Alſter* prope Hamburgum, *Dammthor.*

Tab. CCCXL.

Fumaria claviculis donata. Moriſ. hiſt. 2. 260. f. 3. t. 12. f. 3.
Fumaria, claviculata, *ſiliquis linearibus, foliis cirrhiferis.* Linn. Sp. pl. 985. Hudſ. Angl. 270.
Locus. Paſſim in Comitatu *Oldenburgenſi,* in umbroſis nemoribus, & ſub ſepibus, ad ſaxa & truncos arborum, e. g. *Hunte* prope domum paſtoris, item in prædio *Hahn.*

Tab. CCCXLI.

Bellis annua, capite aphyllo luteo, coronopi folio, caulibus procumbentibus. Moriſ. Hiſt. 3. 30. f. 6. t. 6. f. ult.
Chryſanthemum exoticum minus; capite aphyllo, chamæmeli nudi facie. Breyn. Cent. 156. t. 76.

 Anan-

Ananthocyclus coronopi folio. Dill. Elth. 27. t. 23. f. 26.
Cotula, coronopifolia, *foliis lanceolato linearibus amplexicaulibus pinnatifidis.* Linn. Sp. pl. 1257. Mœhring. E. N. C. 1742. vol. 6. p. 298.
Locus. Prope *Neuenburg* Comitatus Oldenburgenſis ad vias locis inundatis, copioſe.

Tab. CCCXLII.

Veronica III. fruticans. Cluſ. Hiſt. 347.
Veronica foliis ovatis crenatis, fructu ovali, floribus in ſummo caule purpuraſcentibus. Hall. Helv. 532. t. 9.
Veronica, fruticuloſa, *corymbo terminali, foliis lanceolatis obtuſiuſculis, caulibus fruticuloſis.* Linn. Sp. pl. 15. Jacq. Vindob. 201.
Locus. In *Iſlandia, Oxeraa Alting.*

Tab. CCCXLIII.

Gentiana corollis quinquefidis campanulatis, calicis longitudine, caulibus ſpicatim ramoſis multifloris, & folioſis foliis linearibus.
Locus. In Iſlandia. In pratis præfecturæ *Rangervalliæ*, circa *Heclam*, *Bolfield, Sellſund. Eigvindersmule. Hole.*

Tab. CCCXLIV.

Gentiana, quinquefolia, *corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule acutangulo, foliis ovatis amplexicaulibus.* Linn. Sp. pl. 333.
Locus. In Iſlandia. In paſcuis circa *Örebacke*, copioſe, in pratis minus læte; circa *Beſſeſtedt*; in *Rangervallia*; *Hlidarende*, multisque aliis locis.

Tab. CCCXLV.

Helleborine floribus magnis, paucis, purpureis. Hall. Helv. 274.
Serapias bulbis fibroſis floribus ſparſis, petalis lanceolatis, labello ſulcato. Scopol. Carn. 256.
Locus. In ſylva promontorii inſulæ Monæ, parce, ſpecioſa.
Epipactis rubra.

Tab. CCCXLVI.

Alſine, ſerpylli folio, multicaulis & multiflora. Segu. Ver. I. 421. t. 5. f. 2.
Arenaria, ciliata, *foliis ovatis ciliatis acutis.* Linn. Sp. pl. 608. cf. *A. multicaulis.* L. quæ eſt *Alſine foliis lanceolatis, petalis integris calyce majoribus.* Hall. Helv. 390. t. 7. f. 3. Jacq. Vindob. p. 75.
Locus. In Iſlandia.

Tab. CCCXLVII.

Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta parvo flore. C. B. P. 245. Prodr. 116.
Epilobium foliis longis dentatis villoſis parvo flore. Hall. Helv. 410.
Locus. Paſſim ad rivulos fonteſque Sicellandiæ.

Tab. CCCXLVIII.

Sedum alpinum trifido folio. C. B. P. 284. Moriſ. Hiſt. III. 479. ſ. 12. t. 9. f. 26.
Saxifraga foliis omnibus anguſtis petiolatis apice tridentatis, caule folioſo ramoſo viſcido. Hall. Helv. 404.
Saxifraga, hypnoides, *foliis caulinis linearibus integris trifidisque, ſtolonibus procumbentibus, caule erecto nudiuſculo.* Linn. Sp. pl. 579.
Locus. In *Iſlandia,* ad rivulos alpinos.

Tab. CCCXLIX.

Fucus ſ. Alga folio membranaceo purpureo, lapathi ſanguinei figura & magnitudine. Moriſ. Hiſt. III. 645. ſ. 15. t. 8. f. 5. Raj. Syn. III. 47.
Fucus, ſanguineus, *caule tereti ramoſo, frondibus oblongo lanceolatis, undulatis integerrimis.* Hudſ. Angl. 475.
Iſlandis *Oæteſſ ſöl.*
Locus. In fundo oceani Iſlandici.

TAB.

Tab. CCCL.

Fucoides purpureum eleganter plumoſum. Raj. Syn. III. 38. t. 2. f. 5.
Fucus, plumoſus, *caule teretiuſculo compreſſo ramoſo, ramis duplicato pinnatis coloratis.* Hudſ. Angl. 472.
Iſlandis *Aminneſſ ſöl.*
Locus. In fundo oceani Iſlandici.

Tab. CCCLI.

Fucus marinus ſecundus. Dod. pemt. 479.
Fucus, linearis, *dichotomus planus linearis acutus, veſiculis ovatis ſparſis.* Hudſ. Angl. 467.
Locus. In fundo oceani Iſlandici.

Tab. CCCLII.

Fucus dichotomus parvus coſtatus & membranaceus. Raj. Syn. III. 44.
Fucus, alatus, *frondibus planis ſubdichotomis, ramis alternis decurrentibus bifidis.* Hudſ. Angl. 473.
Locus. In oceano *Iſlandico* circa *Beſſeſtedt* & *Örebacke.*

Tab. CCCLIII.

Fucus membranaceus rubens anguſtifolius, marginibus ligulis armatis; & *Fucus membranaceus purpureus latifolius pinnatus.* Raj. Syn. III. 47. n. 33. 34.
Fucus, ciliatus, *frondibus planis ramoſis ciliatis.* Hudſ. Angl. 472.
Locus. In oceano Iſlandico.

Tab. CCCLIV.

Alga cervi cornu diviſura. J. B. III. 785.
Fucus, pinnatifidus, *frondibus planis ramoſis, ramis dentato pinnatifidis, marginibus calloſis.* Hudſ. Angl. 473.
Locus. In oceano Iſlandico.

Tab. CCCLV.

Fucus tenuifolius foliis dentatis. Moriſ. Hiſt. III. 648. ſ. 15. t. 9. f. 4.
Fucus, aculeatus, *ramoſiſſimus lineari filiformis compreſſus: marginibus lateralibus denticulis alternis erectis.* Linn. Sp. pl. 1632. Hudſoni F. uſneoides? Angl. 469. Gunn. fl. Norv. 93.
Iſlandis *Skodle Haar.* Hitterenſibus Norvegis *Kierring Haar.*
Locus. In fundo oceani atlantici, unde ad littora rejicitur.

Tab. CCCLVI.

Ulva, ſobolifera, *coriacea, ſimplex, tubuloſa undique appendiculata.*
Locus. Copioſe in ſcopulis oceani Iſlandici.

Tab. CCCLVII.

Conferva, ſquarroſa, *ſubramoſa, undique obtecta ſetis imbricatis ſquarroſis.*
Iſlandis *Andie Skielja Tang.*
Locus. In ſaxis oceani Iſlandici.

Tab. CCCLVIII.

Conferva dichotoma ſetis porcinis ſimilis. Dill. Muſc. 17. t. 3. f. 9.
Conferva, dichotoma, *filamentis æqualibus dichotomis.* Linn. Sp. pl. 1635. Hudſ. Angl. 481.
Iſlandis *Tuſſa Skieg.*
Locus. In ſaxis oceani Iſlandici.

Tab. CCCLIX.

Lichen alter minor caule calceato. Col. ecphr. I. 331. t. 332.
Lichenaſtrum capitulis rotundis e foliorum medio enaſcentibus. Dill. Muſc. 508. t. 74. f. 41. Mich. Gen. 5. t. 4. f. 1.
Jungermannia, epiphylla, *acaulis, foliolo frondi innato.* Linn. Sp. pl. 1602. fl. ſv. 1047.
Locus. In umbroſis udis, e. g. circa *Fridrichsdal.*

Tab. CCCLX.

Fungus pulverulentus, crepitus lupi dictus, coronatus & inferne ſtellatus. Raj. Syn. III. 27. t. 1. f. 1.
Geaſter major umbilico fimbriato. Mich. Gen. 220. t. 100. f. 1.
Lycoperdon, ſtellatum, *volva multifida patente, capitulo glabro; ore acuminato dentato.* Linn. Sp. pl. 1653.
Locus. In paſcuis ſiccioribus paſſim.

MONITUM.


Plantas Iſlandicas, cum has quas præſens faſciculus exhibet, tum alias præterea alio tempore proponendas, debemus Dno *Joanni Gerhardo Kœnig*, Pharmaciæ ſtudioſo, Hiſtoriæ Naturalis omnis ſtrenuo cultori, qui Regio ſtipendio plantarum pro Flora Danica conquirendarum cauſſa in Iſlandiam miſſus, commoratus ibi eſt æſtatibus annorum 1764. 1765. & hyeme interjecta.

HAFNIÆ, typis C. PHILIBERT.


Proſtat apud Autorem, & Bibliopolam Philibert.







Flora Danica Tab. CCCIV.













Flora Danica Tab. CCCX.



Flora Danica Tab. CCCXI.



Flora Danica Tab. CCCXII.





Flora Danica Tab. CCCXIV.









Flora Danica Tab. CCCXVIII.



Flora Danica Tab. CCCXIX.





Flora Danica Tab. CCCXXI.



Flora Danica Tab:CCCXXII.





Flora Danica Tab. CCCXXIV













Flora Danica Tab. CCCXXX





Flora Danica Tab. CCCXXXII




Flora Danica Tab. CCCXXXIII.




Flora Danica Tab. CCCXXXIV.



Flora Danica Tab. CCCXXXV.



Flora Danica Tab. CCCXXXVI.



Flora Danica Tab. CCCXXXVII.





Flora Danica Tab. CCCXXXIX.











Flora Danica Tab. CCCXLIV.















Flora Danica Tab. CCCLI.



Flora Danica Tab. CCCLII.



Flora Danica Tab. CCCLIII.







Flora Danica Tab. CCCLIV.













Flora Danica Tab. CCCLIX.



Flora Danica Tab. CCCLX.

